

ミネビタさじかげん

包装：10kg紙袋




肥育後期のビタミンA不足時の対策に！

Aタイプ：増体は良いが、肉質が悪い。

Bタイプ：増体、肉質がばらつく。
ビタミンA欠乏症が多発する。

Cタイプ：時々、肉質が良いが増体が悪い。
ビタミンA欠乏による食い止まりが見られる。

Dタイプ：優良事例。増体・肉質ともに良い。



内容成分

ビタミンA、ビタミンD₃、ビタミンE、貝化石（微量ミネラル）
【ビタミンA：21,000単位/50g（42万単位/kg）】

●給与方法

- ミネビタさじかげんを飼料に十分混合して給与して下さい。
- 1牛房あたりの飼養頭数が多く、飼料摂取量にバラつきが想定される場合には、2～3回に分けて与えてください。

●給与量（黒毛和種去勢牛1頭に対する目安）

- 肥育中期**：ビタミンA不足による飼料摂取量低下の予防
⇒50g×1～2回/月（飼料摂取量が回復したら投与中止）
- 肥育後期**：ビタミンA欠乏症、飼料摂取量低下の改善
⇒50g×2～4回/月（継続的に）

※ビタミンA欠乏症状がひどい場合は、獣医師に相談して下さい。



- ①開封後、なるべく早く使って下さい。
②日陰で、風通しのよい乾燥した場所に保管し、開封後はしゃ光した密閉容器に保存して下さい。
③対象家畜、使用量を必ず守って下さい。